

Règles de mesure des tailles (mer du Nord, Manche, Atlantique)

Poisson : de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

Mollusques bivalves : la plus grande dimension de la coquille.

Langoustine :

– parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace),

– et/ou de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des *setae* (longueur totale),

– queue de langoustine détachée : à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des *setae*. Mesure faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.

Homard : longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.

Langouste : longueur de la carapace, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.

Araignées de mer : longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane, du bord de la carapace entre les rostrés jusqu'au bord postérieur de la carapace.

Tourteau : largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.

Grand migrateur : en longueur fourche, distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court (sauf istiophoridé).

Istiophoridé : de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.

Rappel :

Depuis le 17 mai 2011, marquage obligatoire des espèces par ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.

Les captures doivent être conservées entières jusqu'à leur débarquement pour permettre le contrôle de leur taille.

(CF fiche d'information spécifique)

Attention :

Les tailles et règles de mesure sont différentes pour la mer Méditerranée.

Pour en savoir plus :

Direction interrégionale de la mer (DIRM)
Nord Atlantique-Manche Ouest : 02.90.02.69.50
ou la direction interrégionale de la mer de votre région

Délégation à la mer et au littoral de votre département



Direction interrégionale de la mer
Nord Atlantique-Manche Ouest
DIRM NAMO
BP 78749, 2 boulevard Allard
44187 NANTES cedex 4
Tél. : 33 (0) 2 40 44 81 10
Fax : 33 (0) 2 40 73 33 26
dirm-namo@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté ministériel

du

26 octobre 2012

modifié

PÊCHE MARITIME

DE LOISIR

Taille minimale de capture des poissons, crustacés et mollusques

Les tailles (ou poids) à respecter s'appliquent aux espèces listées ci-après, et à toute pêche maritime de loisir

- à partir de **navires** ou embarcations de plaisance :
 - ▶ battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture,
 - ▶ étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française,
- en action de **nage** ou de **plongée**,
- à pied** sur le domaine public maritime et sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

Sanctions applicables en cas d'infraction :

- amende pénale ((jusqu'à 22 500€),
- sanction administrative (amende jusqu'à 1 500€/quintal, retrait de l'autorisation de pêcher le thon rouge).

Seul le texte
du l'arrêté ministériel du 26 octobre 2012 modifié par
l'arrêté du 29 janvier 2013, publié au Journal officiel le 22 février
2013, fait foi.



Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest



Liste des espèces de poissons et organismes marins concernés

Mer du Nord, Manche, Atlantique

Mer du Nord, Manche, Atlantique

Mer du Nord, Manche, Atlantique

Poissons

- Alose (*Alosa spp.*) : 30 cm
- Anchois (*Engraulis encrasicolus*) : 12 cm
- Bar commun (*Dicentrarchus labrax*) : 42 cm
- Bar moucheté (*Dicentrarchus punctatus*) : 30 cm
- Barbue (*Scophthalmus rhombus*) : 30 cm
- Cabillaud (*Gadus morhua*) : 42 cm
- Cardine (*Lepidorhombus spp.*) : 20 cm
- Chapon (*Scorpaena scrofa*) : 30 cm
- Chinchard (*Trachurus spp.*) : 15 cm
- Congre (*Conger conger*) : 60 cm
- Corb (*Sciaena umbra*) : 35 cm
- Dorade grise et dorade rose / pageot rose
(*Spondylusoma cantharus* et *Pagellus bogaraveo*) : 23 cm
- Dorade royale (*Sparus aurata*) : 23 cm
- Eglefin (*Melanogrammus aeglefinus*) : 30 cm
- Espadon (*Xiphias gladius*) : 170 cm *(LJFL)
- Flet (*Platichthys flesus*) : 20 cm
- Germon (*Thunus alalunga*) : 2 kg
- Hareng (*Clupea harengus*) : 20 cm
- Lieu noir (*Pollachius virens*) : 35 cm
- Lieu jaune (*Pollachius pollachius*) : 30 cm
- Lingue (*Molva molva*) : 63 cm
- Lingue bleue (*Molva dipterygia*) : 70 cm
- Limande (*Limanda limanda*) : 20 cm
- Limande sole (*Microstomus kitt*) : 25 cm
- Lotte (*Lophius piscatorius*) : 50 cm
- Maigre (*Argyrosomus regius*) : 45 cm
- Makaire blanc (*Tetrapturus spp.*) : 168 cm *(LJFL)
- Makaire bleu (*Makaira nigricans*) : 251 cm *(LJFL)
- Maquereau (*Scomber spp.*) : 20 cm
- Maquereau -mer du Nord (*Scomber spp.*) : 30 cm
- Merlan (*Merlangius merlangus*) : 27 cm
- Merlu (*Merluccius merluccius*) : 27 cm
- Mostelle (*Phycis spp.*) : 30 cm
- Mulet (*Mugil spp.*) : 30 cm
- Orphie (*Belone spp.*) : 30 cm
- Plie / carrelet (*Pleuronectes platessa*) : 27 cm
- Rougets (*Mullus spp.*) : 15cm


- Sar commun (*Diplodus sargus*) : 25 cm
- Sardine (*Sardina pilchardus*) : 11 cm
- Saumon (*Salmo salar*) : 50 cm
- Sole (*Solea spp.*) : 24 cm
- Thon rouge (*Thunnus thynnus*) : 30 kg ou 115 cm
(longueur à la fourche)
- Truite de mer (*Salmo trutta*) : 35 cm
- Turbot (*Psetta maxima*) : 30 cm



Thon rouge
115 cm ou 30 kg


Crustacés

- Araignée de mer (*Maia squinado, Maja brachydactyla*) : 12 cm
- Bouquet / crevette rose (*Palaemon serratus*) : 5 cm
- Crevettes (autres que bouquet) (*Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. hors Palaemon serratus*) : 3 cm
- Étrille (*Polydora henslowi, Necora puber*) : 6,5 cm
- Homard (*Homarus gammarus*) : 8,7 cm *(LC)
- Langouste rouge (*Palinurus spp.*) : 11 cm *(LC)
- Langoustine (*Nephrops norvegicus*) : 9 cm *(LT)
- Queue de langoustine : 4,6 cm
- Tourteau -Nord du 48° parallèle Nord-
(*Cancer pagurus*) : 14 cm
- Tourteau -Sud du 48° parallèle Nord-
(*Cancer pagurus*) : 13 cm



Mollusques

- Buccin / bulot (*Buccinum undatum*) : 4,5 cm
- Clovisse (*Venerupis pullastra*) : 4 cm
- Couteau (*Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp.*) : 10 cm
- Coque / hénon (*Cerastoderma edule*) : 3 cm
- Coquille Saint-Jacques (*Pecten maximus*) : 11 cm
- Huître creuse (*Crassostrea gigas*) : 5 cm
- Huître plate (*Ostrea edulis*) : 6 cm
- Mactre solide (*Spisula solida*) : 2,5 cm
- Moule (*Mytilus edulis*) : 4 cm
- Olive de mer / telline (*Donax spp. et Tellina spp.*) : 2,5 cm
- Ormeau (*Haliotis spp.*) : 9 cm
- Oursin (*Paracentrotus lividus*) : 4 cm (piquants exclus)
- Oursin -région Bretagne- (*Paracentrotus lividus*) : 5,5 cm (piquants exclus)
- Palourde européenne (*Ruditapes decussatus*) : 4 cm
- Palourde japonaise (*Ruditapes philipinarum*) : 4 cm
- Palourde rose (*Venerupis rhomboides*) : 4 cm
- Palourde rouge / vernis (*Callista spp.*) : 6 cm
- Praire / clam (*Venus verrucosa, Mercenaria mercenaria*) : 4,3 cm
- Poulpe (*Octopus vulgaris, Eledone cirrhosa*) : 750 g
- Vanneau ou pétoncle (*Chlamys spp.*) : 4 cm
- Venus (*Spisula spp.*) : 2,8 cm



* (LJFL) = longueur maxillaire inférieure-fourche
*(LT) = longueur totale
*(LC) = longueur céphalothoracique