



Ifremer

**RESCO**

Réseau national d'Observations Conchylicole

### **Bulletin N°03 : 08 Juin 2012**

*Les suivis réalisés par le RESCO portent sur les lots d'huîtres suivants :*

- *naissain naturel provenant de 3 sites de captage (Arcachon, Marennes et Bourgneuf)*
- *naissain triploïde (3 écloséries différentes)*
- *huîtres de 18 mois de captage naturel.*

*L'ensemble de ces lots a été mis en place sur les 13 sites suivis par le RESCO, fin Février pour le lot de 18 mois (semaine 8) et début Avril pour les lots de naissain (semaine 14).*

*Les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par le RESCO, et ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots d'élevage.*

Ce bulletin concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses du réseau RESCO, lors des passages réalisés sur l'ensemble des sites entre le 31 mai et le 08 juin 2012 (semaines 22-23).

Les tendances observées sur les lots de naissain, à la date arrêtée du 08 juin 2012, sont les suivantes :

- **Une très forte augmentation des taux de mortalité affectant les lots de captage naturel sur l'ensemble des sites méridionaux.** En effet, les sites de **l'étang de Thau**, mais aussi des secteurs d'**Arcachon, Marennes-Oléron, Ile de ré, Baie de Bourgneuf, rivière de Penerf, Golfe du Morbihan**, et de la rade de Brest présentent désormais des **taux de mortalité allant de 22% à 86%**, avec **des taux moyens d'environ 65%**.

Seuls les **sites situés plus au Nord** (secteurs de la baie de Morlaix, baie du Mont Saint Michel, côte ouest Cotentin et baie des Veys) semblent **encore épargnés par cette vague de mortalité, avec des taux moyens d'environ 6%**.

- **Une forte augmentation des taux de mortalité affectant les lots issus d'écloserie** est également constatée sur **ces mêmes secteurs méridionaux**, à l'exception du site de Larmor Baden, sur lequel l'ensemble de ces lots sont encore épargnés. Les **taux de mortalité** observés sur les **sites affectés** vont de **2% à 91%** (montrant une grande hétérogénéité des lots), pour un **taux moyen d'environ 45%** (hors secteur Larmor Baden).

Les secteurs de **la baie de Morlaix, baie du Mont Saint Michel, côte ouest Cotentin et baie des Veys** présentent des taux de **mortalité beaucoup plus faibles** sur ces lots d'écloserie, avec un **taux moyen de 5% ± 6%**.

Concernant le lot **d'huîtres adultes de 18 mois**, la moyenne nationale des taux de mortalité cumulée est de **5.3% ± 1.5**. Cette classe d'âge reste donc relativement peu affectée par les mortalités,

Plus d'informations sur [http://wwz.ifremer.fr/observatoire\\_conchylicole](http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole)