

**Bulletin N°05 : 10 Juillet 2012**

*Les suivis réalisés par le RESCO portent sur les lots d'huîtres suivants :*

- *naissain naturel provenant de 3 sites de captage (Arcachon, Marennes et Bourgneuf)*
- *naissain triploïde (3 écloseries différentes)*
- *huîtres de 18 mois de captage naturel.*

*L'ensemble de ces lots a été mis en place sur les 13 sites suivis par le RESCO, fin Février pour le lot de 18 mois (semaine 8) et début Avril pour les lots de naissain (semaine 14).*

*Les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par le RESCO, et ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots d'élevage.*

Ce bulletin concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses du réseau RESCO, lors des passages réalisés sur l'ensemble des sites entre le 02 et le 06 juillet 2012 (semaine 27).

Les tendances observées sur les lots de naissain, à la date arrêtée du 07 juillet 2012, sont les suivantes :

- Une forte augmentation de la mortalité sur le site de '**Géfosse**' en **baie des Veys**, qui était jusqu'ici épargné. Les taux de mortalité atteignent **41% ± 20%** pour les lots de **captage naturel** et **12% ± 8%** pour les **lots d'écloserie**.
- Une augmentation des taux de mortalité est également observée sur les sites de **Morlaix** et de **Cancalle**, même si une **hétérogénéité** perdure au sein des différents lots suivis. On observe ainsi, en moyenne sur ces deux sites, des taux de **56% ± 21%** pour les lots de **captage naturel** et **35% ± 20%** pour les **lots d'écloserie**.
- Une **mortalité** est également constatée sur le site de '**Men Er Roué**' en **baie de Quiberon** (d'après le dernier passage effectué semaine 19). En effet les taux de mortalité s'échelonnent de **25 à 45%** sur les **différents lots**. Cependant, environ **60% des huîtres mortes présentent des coquilles percées**, et ce quel que soit le lot considéré.
- La **vague de mortalité** semble s'être **stabilisée** sur les autres sites situés plus au sud, tels que **Loix-en-Ré**, **D'Agnas**, le **Tes** ou encore **Marseillan**, les **augmentations détectées** par rapport au dernier passage étant **variant de 0 à 4%**.

Concernant le lot **d'huîtres adultes de 18 mois**, la moyenne nationale des taux de mortalité cumulée est de **8.5% ± 4.1%**. De même que sur les lots de naissain, le suivi des lots de 18 mois en **baie de Quiberon** indique **des taux de mortalité d'environ 19%**, avec **plus de la moitié des individus** morts présentant une **coquille percée**.