

**Bulletin N°10 : 20 Novembre 2012**

Les suivis réalisés par le RESCO portent sur les lots d'huîtres suivants :

- *naissain naturel provenant de 3 sites de captage (Arcachon, Marennes et Bourgneuf)*
- *naissain triploïde (3 écloséries différentes)*
- *huîtres de 18 mois de captage naturel.*

L'ensemble de ces lots a été mis en place sur les 13 sites suivis par le RESCO, fin Février pour le lot de 18 mois (semaine 8) et début Avril pour les lots de naissain (semaine 14).

Les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par le RESCO, et ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots d'élevage.

Ce bulletin concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses du réseau RESCO, lors des passages réalisés sur l'ensemble des sites entre le 12 et le 16 Novembre 2012 (semaine 46).

Les tendances observées sur les lots de naissain sont les suivantes :

- Une **stabilisation globale** du phénomène des mortalités sur l'ensemble de lots de naissain suivis, **à l'exception de l'un des lots d'écloserie**.
- En effet, pour ce lot, des **hausse de mortalité supérieures à 5%** sont observées sur **plus de la moitié des sites étudiés**. Ces hausses restent **relativement faibles** (de 2 à 10% par rapport au mois précédent) mais reflètent néanmoins une **vague de mortalité persistante et résiduelle** affectant aujourd'hui ces lots **âgés de 16 mois**.
- Ce phénomène est observé à la fois pour des **sites situés au Nord** (*i.e.* site Géfosse présentant une hausse de 9.% de mortalité en un mois) que pour des **sites plus au sud** (*i.e.* site D'Agnas présentant une hausse de mortalité de 10% en un mois).
- Malgré cette légère augmentation constatée sur certains sites, le **taux moyen de mortalité** de ce lot reste aux alentours de **65%** avec un minimum observé pour le site Géfosse (48%) et un maximum pour le site de Loix (95%). Ce lot ne représente donc **pas le lot le plus impacté** pour les mortalités, qui lui est affecté **à hauteur de 76%**, et pour lequel la **mortalité** semble aujourd'hui **stoppée**.

Concernant le lot **d'huîtres adultes de 18 mois**, la moyenne nationale des taux de mortalité cumulée est de **13.3% ± 5.4%**. On continue ainsi d'observer une **légère hausse** du taux de mortalité observé sur le **lot 18 mois**, sur des sites tels que **Géfosse** et sur la **Pointe du château** (augmentation de près de 4% en un mois). **Comparativement** aux taux de mortalités observés lors des **années précédentes** (à la même époque) sur ce lot, les valeurs obtenues sont **3 à 4 fois supérieures**.