

**Bulletin N°08 : 07 Août 2015**

Les suivis réalisés par le RESCO II portent sur les lots d'huîtres suivants :

- *naissain diploïde standardisé Ifremer (NSI) produit en 2014.*
- *huîtres de 18 mois (ex-NSI produit en 2013).*
- *huîtres de 30 mois (ex-18 mois de 2013).*

L'ensemble de ces lots a été mis en place début mars (semaine 10) sur les 12 sites suivis par le RESCO II.

Les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par le RESCO II, et ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots d'élevage.

Ce bulletin concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses du réseau RESCO II, lors des passages réalisés sur l'ensemble des sites entre le 30 Juillet et le 05 Août 2015 (semaine 32).

L'ensemble des mortalités est désormais stabilisé, sur l'ensemble des classes d'âge pour les différents sites suivis, à l'exception du site de Géfosse concernant le lot de 18 mois. En effet, aucune augmentation significative de mortalité par rapport à la semaine 29 n'est observée. Le **lot NSI** atteint ainsi une **mortalité moyenne de 46,0% ± 12,2** avec des disparités selon les sites.

- Les **sites les plus impactés** pour le lot NSI se situent dans la **moitié Sud de la France**, à l'exception du site du **Tes** (bassin d'Arcachon) qui présente un taux de mortalité relativement faible (**43,8% ± 4,8**) par rapport aux autres sites (taux compris entre 61% et 70% environ).
- Les **sites situés plus au Nord** présentent des **taux de mortalité plus faibles**, compris entre 32% et 45%. Seule une très faible mortalité continue d'être observée sur ces sites.

En ce qui concerne le lot **d'huîtres adultes de 18 mois**, la moyenne nationale des taux de mortalité cumulée reste **assez faible** (**7,2% ± 5,7**) malgré une légère augmentation continue d'un suivi à l'autre. Lors de cette semaine 32, un seul site présente **une hausse importante** de la mortalité, soit le site de Géfosse (Baie des Veys) avec 7,4% d'augmentation par rapport à la semaine 29. La mortalité cumulée du lot d'adultes 18 mois pour ce site passe donc au-delà des 20% (**20,9% ± 1,4**).

Le lot **d'huîtres adultes de 30 mois** reste **très peu affecté** par la mortalité sur l'ensemble des sites, avec une moyenne atteignant **4,3% ± 2,6**.

Plus d'informations sur http://wwwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole