



Bulletin N°12 : 04 Novembre 2011

Les suivis réalisés par l'Observatoire portent sur les lots d'huîtres suivants :

- naissain de captage naturel de deux origines (Arcachon et Marennes)
- naissain triploïde
- huîtres de 18 mois de captage naturel.

L'ensemble de ces lots a été mis en place sur les 14 sites suivis par l'Observatoire, entre mi-mars et mi-avril 2011.

Les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par l'Observatoire, et ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots d'élevage.

Ce bulletin concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses de l'Observatoire national conchylicole, lors des passages réalisés sur l'ensemble des sites entre le 24 et le 28 novembre 2011 (semaine 43).

Les tendances observées sur le naissain durant cette période sont les suivantes :

- L'ensemble de **la situation reste stable sur la totalité des sites** suivis par l'Observatoire Conchylicole, par rapport à la semaine 39.

La seule **exception** concerne un **lot de naissain du site de la rade de Brest**, présentant une **augmentation du taux de mortalité d'environ 6%** par rapport à la marée précédente. Des analyses pathologiques réalisées sur ce lot de naissain montrent une forte présence de *Vibrio aesturianus* depuis début Août, alors que ce *vibrio* n'est pas détecté sur les autres lots du même site.

- Les taux de mortalité observés sur les lots de naissain du **site de Loix en Ré** ne permettent plus, compte tenu du **faible nombre de survivants**, d'estimer correctement l'évolution du phénomène. En effet, les **taux de mortalité** peuvent atteindre **99%** sur certains lots de ce site.
- Un **problème technique** survenu lors des suivis réalisés sur le site **de Marseillan filières en mer Méditerranée** a entraîné une exposition trop longue à l'air et au soleil des lots concernés. Les **forts taux de mortalité observés**, aussi bien sur les lots de naissain que sur le lot de 18 mois sur ce site, sont directement liés à cet évènement, et non pas à un phénomène de mortalité « naturelle ».
- La moyenne nationale des taux mortalité des différents naissains, observés sur l'ensemble des sites, est de **62.3% ± 17%**, avec un **taux minimum de 13.2%** et un **taux maximum de 98.8%** (hors filières méditerranéennes) .

Les **taux de mortalité moyen** observés sur le lot "18 mois" est de **5.6% ± 3%** (hors filières méditerranéennes).