



Bulletin N°13 : 01 Décembre 2011

Les suivis réalisés par l'Observatoire portent sur les lots d'huîtres suivants :

- naissain de captage naturel de deux origines (Arcachon et Marennes)
- naissain triploïde
- huîtres de 18 mois de captage naturel.

L'ensemble de ces lots a été mis en place sur les 14 sites suivis par l'Observatoire, entre mi-mars et mi-avril 2011.

Les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par l'Observatoire, et ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots d'élevage.

Ce bulletin concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses de l'Observatoire national conchylicole, lors des passages réalisés sur l'ensemble des sites entre le 21 et le 25 novembre 2011 (semaine 47).

Les tendances observées sur le naissain durant cette période sont les suivantes :

- L'ensemble de **la situation reste stable sur la totalité des sites** suivis par l'Observatoire Conchylicole, par rapport à la semaine 43.

La seule **exception** concerne un **lot de naissain du site de Loix en Ré**, présentant une **augmentation du taux de mortalité d'environ 5%** par rapport à la marée précédente. Notons que cette mortalité concerne un des lots de naissain qui avait été relativement épargné pour le moment (mortalité de 54%), comparativement aux autres lots de naissains observés sur ce site (respectivement 98 et 99% de mortalité), pour lesquels les évolutions ne sont plus représentatives du phénomène.

- Un **problème technique** survenu lors des suivis réalisés sur le site **de Marseillan filières en mer Méditerranée** a entraîné une exposition trop longue à l'air et au soleil des lots concernés. Les **forts taux de mortalité observés**, aussi bien sur les lots de naissain que sur le lot de 18 mois sur ce site, sont directement liés à cet évènement, et non pas à un phénomène de mortalité « naturelle ». Depuis, **une augmentation du taux de mortalité de 9.4%** sur l'un des lots de naissain suivi sur ce site a été observée.

- La moyenne nationale des taux mortalité des différents naissains, observés sur l'ensemble des sites, est de **62.8% ± 17%**, soit un très faible augmentation (+ **0.5%**) par rapport à la marée précédente .

Le **taux de mortalité moyen** observé sur le lot "18 mois" est de **6.1% ± 3.5%** (hors filières méditerranéennes), avec, en outre, une **augmentation de 3.4%** du taux de mortalité observée sur le site de **Loix en Ré**, par rapport à la marée précédente.

Plus d'informations sur http://www.ifremer.fr/observatoire_conchylicole