



# Diagnostic



## Baudroies de l'Ouest de l'Ecosse et de la mer du Nord

Mise à jour :  
**2018**



Evolution du taux d'exploitation (à gauche) et de l'indice de biomasse moyen (campagne écossaise en zone 4 et 6) (à droite)

**Diagnostic** : Le diagnostic pour ces espèces est qualitatif et repose sur l'évolution des indices d'abondance estimés par les campagnes scientifiques. La biomasse est estimée globalement en hausse depuis 2011, avec une petite baisse estimée en 2018.

Les rejets sont faibles (3%) mais sont intégrés dans l'avis.

| Stock           | B/Bpa   | Tendance B | F/Fpa   | Tendance F | F/Fmsy | F/Fplan    | B/MSY-Btrigger |
|-----------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|----------------|
| Baudroies (4,6) | ?B?Ref? | ↗          | ?F?Ref? | ?          | ?      | sans objet |                |

**Avis** : Le CIEM formule sa recommandation, dans le cadre de l'approche de précaution, sur la base de l'évolution de l'indice de biomasse donné par la campagne scientifique. L'indice est estimé avoir augmenté de 25% entre 2014-2016 et 2017-2018. La recommandation est donc une augmentation (limitée à 20%) par rapport au précédent avis, sans application de la diminution supplémentaire de 20% (approche de précaution) compte tenu de la forte augmentation de la biomasse. Les captures en 2019 ne devraient donc pas dépasser 31 690 t.