



Diagnostic



Baudroie noire de mer Celtique et du golfe de Gascogne

Mise à jour :
2018



Diagnostic : Le diagnostic pour cette espèce est qualitatif et repose sur l'évolution d'un indice d'abondance estimé par les campagnes scientifiques. La biomasse est estimée relativement stable depuis 2009. La mortalité par pêche estimée à partir de l'analyse des structures en taille est estimée en baisse et, en 2017, inférieure au niveau permettant le rendement maximal durable (F_{msy}).

Les rejets (13% en 2017) sont inclus dans l'évaluation et dans l'avis.

| Stock | B/B _{pa} | Tendance B | F/F _{pa} | Tendance F | F/F _{msy} | F/F _{plan} | B/MSY-B _{trigger} |
|-------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Baudroie noire (7b-k,8abd) | ?B?Ref? | ↘ | ?F?Ref? | ↘ | proxy | sans objet | ? |

Le stock est considérant comme ne souffrant pas de surpêche, mais son statut relatif à la biomasse est inconnu.

Avis : Le CIEM formule sa recommandation, dans le cadre de l'approche de précaution, sur la base de l'évolution de l'indice de biomasse donné par les campagnes scientifiques. L'indice est estimé avoir augmenté de 7% entre 2013-2015 et 2016-2017 (la valeur de l'indice 2018 n'est pas connue). La recommandation est donc une augmentation de 7% par rapport au précédent avis, mais en appliquant la diminution supplémentaire de 20% (approche de précaution) compte tenu de l'inconnu sur le niveau de la biomasse en 2018. Les captures en 2019 ne devraient donc pas dépasser 10 799 t.