


Diagnostic



Langoustine du golfe de Gascogne

Mise à jour :
2018



Diagnostic : Le stock est évalué par une campagne de vidéo sous-marin (comptage des terriers). L'abondance a légèrement augmenté en 2018, après une baisse en 2017. Le taux d'exploitation en 2017 est légèrement supérieur au taux correspondant à une exploitation maximale durable.

Les rejets sont estimés à 56% (en nombre) et sont intégrés à l'avis (avec un taux de survie de 30%).

Stock	B/B _{pa}	Tendance B	F/F _{pa}	Tendance F	F/F _{msy}	F/F _{plan}	B/MSY-B _{trigger}
Langoustine (FU23-24)	?B?Ref?	+	?F?Ref?	+	1.09	sans objet	?

Le stock souffre d'une légère surpêche en 2017 (taux d'exploitation supérieur à celui permettant une exploitation maximale durable) ; son statut (en termes de biomasse) est inconnu.

Avis : Le CIEM recommande que, dans le cadre de l'approche RMD, le taux d'exploitation en 2019 soit au niveau de celui permettant d'atteindre le rendement maximal durable (F_{msy}), ce qui correspond à des captures d'au plus 6 221 t, ce qui correspond à une augmentation d'un peu plus de 12% par rapport à la recommandation de l'an dernier, du fait de l'augmentation de l'abondance.