

Diagnostic 2020

Rappel:

Stock en bon état : stock non surpêché ($F < F_{RMD}$) et non dégradé ($B > B_{ref}$)

Stock reconstituable (ou en voie de reconstitution) : stock non surpêché ($F < FRMD$) mais dégradé ($B < B_{ref}$) ou non classifié en termes de biomasse

Stock surpêché : $F > F_{RMD}$ mais non dégradé ($B > B_{ref}$)

Stock surpêché et dégradé ($F > FRMD$ et $B < B_{ref}$)

* : stock surpêché mais exploité conformément au plan de gestion en vigueur

Stock effondré : $B < B_{lim}$

Stock non classifié : stock évalué mais pour les quelles les estimations de mortalité et de biomasse sont considérées incertaines et/ou pour lesquels les points de référence ne sont pas définis

% = Débarquement du stock / Débarquement toutes espèces en France métropolitaine (359 kt en 2019)

Stock	%	Etat
Aiguillat commun (<i>Squalus acanthias</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Division 37.GSA7 (Golfe du Lion)	0.2%	reconstituable/en voie de reconstitution
Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sous-zone VIII (Golfe de Gascogne)	0.6%	en bon état
Anguille d'Europe (<i>Anguilla anguilla</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	effondré
Anguille d'Europe (<i>Anguilla anguilla</i>) Méditerranée et mer noire	0.1%	effondré
Araignée européenne (<i>Maja squinado</i>) Division VIIe	1.5%	en bon état
Araignée européenne (<i>Maja squinado</i>) Divisions VIIIa et VIIIb	0.3%	en bon état
Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Divisions IVbc VIIa et VIId à VIIh	0.1%	reconstituable/en voie de reconstitution
Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Divisions VIa VIIb et VIIj	0.0%	non classifié
Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Divisions VIIIa b (Golfe de Gascogne)	0.6%	en bon état
Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Divisions VIIIc and Ixa	0.0%	non classifié
Barbue (<i>Scophthalmus rhombus</i>) Sous-zone IV et Divisions IIIa, VIId et VIle	0.1%	en bon état
Baudroies nca (<i>Lophius piscatorius</i> and <i>L. budegassa</i>) Division IIIa et sous-zones IV et VI	0.4%	non classifié
Baudroies nca (<i>Lophius piscatorius</i> and <i>L. budegassa</i>) Divisions de VIIb à VIIk et VIIIa VIIIb VIIIc	4.4%	en bon état
Baudroies nca (<i>Lophius piscatorius</i> and <i>L. budegassa</i>) Divisions VIIIc et IXa	0.0%	en bon état
Béryx nca (<i>Beryx spp</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	non classifié
Brosme (<i>Brosme brosme</i>) Sous-zones I et II	0.0%	en bon état
Brosme (<i>Brosme brosme</i>) Sous-Zones IV, VII, VIII et IX, divisions IIIa, Vb, VIa et XIIb	0.0%	en bon état
Buccin (<i>Buccinum undatum</i>) Division VIId	1.6%	surpêché et dégradé
Buccin (<i>Buccinum undatum</i>) Division VIle	2.2%	supêché
Calmars côtiers nca (<i>Loliginidae</i>) Divisions VIId et VIle	0.6%	surpêché
Calmars côtiers nca (<i>Loliginidae</i>) Divisions VIIIa et VIIIb	0.3%	surpêché et dégradé
Cardines (<i>Lepidorhombus spp</i>) Division VIb (Rockall)	0.0%	en bon état
Cardines (<i>Lepidorhombus spp</i>) Divisions de VIIb à VIIk, VIIIa VIIIb et VIIIc	1.2%	en bon état
Cardines (<i>Lepidorhombus spp</i>) Divisions VIIIc et Ixa	0.0%	en bon état
Cardines (<i>Lepidorhombus spp</i>) Sous-zone IV et division VIa	0.1%	en bon état
Chien espagnol (<i>Galeus melastomus</i>) Sous-zone VIII et division Ixa	0.0%	non classifié
Chien espagnol (<i>Galeus melastomus</i>) Sous-zones VI et VII	0.0%	non classifié
Chinard d'Europe (<i>Trachurus trachurus</i>) Divisions IIa, IVa, Vb, VIa, de VIIa à VIIc, de VIle à VIIk, VIII	1.1%	surpêché et dégradé
Chinard d'Europe (<i>Trachurus trachurus</i>) Divisions IIIa, IVb et IVc et VIId	0.2%	surpêché et dégradé
Coquille St-Jacques Atlantique (<i>Pecten maximus</i>) Division VIId	6.2%	en bon état
Coquille St-Jacques Atlantique (<i>Pecten maximus</i>) Division VIle	2.5%	en bon état
Dorade rose (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Sous-zones VI, VII et VIII	0.0%	effondré
Églefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) Division Vb	0.0%	supêché
Églefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) Division VIb (Rockall)	0.0%	supêché
Églefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) Divisions VIIb à VIIk	1.2%	supêché
Églefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) Sous-zone IV et Divisions IIIan et VIa	0.1%	en bon état
Églefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) Sous-zones I et II	0.0%	supêché
Émissoles (<i>Mustelus spp</i>) Atlantique Nord-Est	0.8%	reconstituable/en voie de reconstitution
Espadon (<i>Xiphias gladius</i>) Méditerranée et Mer Noire	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Flet d'Europe (<i>Platichthys flesus</i>) Division IIIa et sous-zone IV	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Flétan noir (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) Sous-zones I et II	0.0%	non classifié
Flétan noir (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) Sous-zones V, VI, XII et XIV	0.0%	supêché
Germon (<i>Thunnus alalunga</i>) Atlantique Nord-Est	2.0%	en bon état
Germon (<i>Thunnus alalunga</i>) Méditerranée et Mer Noire	0.0%	en bon état
Grande argentine (<i>Argentina silus</i>) Divisions Vb VIa	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Grande argentine (<i>Argentina silus</i>) Sous-zones I II IV et Division IIIa	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Grande argentine (<i>Argentina silus</i>) Sous-zones VII VIII IX X XII et Division VIb	0.0%	non classifié
Grande roussette (<i>Scyliorhinus stellaris</i>)Sous-zones VI et VII	0.1%	non classifié
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) Sous-zones I, II, IV, VIII, IX et division XIVa, sous-divisions Va2 et XIVb2	0.0%	non classifié
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) Sous-zones VI et VII, Divisions Vb et XIIb	0.0%	non classifié
Grondin gris (<i>Eutrigla gurnardus</i>) Sous-zone IV et divisions VIId, IIIa	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Grondin rouge (<i>Chelidonichthys cuculus</i>) Zones III-VIII (Atlantique Nord-Est)	0.6%	non classifié
Hareng de l'Atlantique (<i>Clupea harengus</i>) Divisions VIas (Sud), VIIb et VIc	0.0%	effondré
Hareng de l'Atlantique (<i>Clupea harengus</i>) Divisions VIIs (au Sud de 52° 30' N), de VIlg à VIIk	0.0%	effondré
Hareng de l'Atlantique (<i>Clupea harengus</i>) Sous-zone IV et Divisions IIIa et VIId	6.3%	reconstituable/en voie de reconstitution
Homard européen (<i>Homarus gammarus</i>) Divisions VIle et VIIIa	0.1%	en bon état
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) Division IVbc (FU 5)	0.0%	non classifié
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) Division VIIIc (FU 31)	0.0%	effondré
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) Divisions VIIa VIIg VIIj (FU 19)	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) Divisions VIIb VIIc VIIj VIIk (FU 16)	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) Divisions VIIg VIIh (FU 22)	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) Divisions VIIg VIIh (FU 20 et FU 21)	0.0%	surpêché et dégradé
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) Divisions VIIIa VIIIb (FU 23 - 24)	0.6%	reconstituable/en voie de reconstitution
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>) Sous-zone IV et Division IIIa	0.0%	non classifié
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>) Sous-zone VIII et division IXa	0.3%	non classifié

Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>) Sous-zones VI et VII	0.1%	reconstituable/en voie de reconstitution
Lieu noir (<i>Pollachius virens</i>) Division Vb	0.0%	supêché
Lieu noir (<i>Pollachius virens</i>) Sous-zones I et II	0.4%	en bon état
Lieu noir (<i>Pollachius virens</i>) Sous-zones IV et VI, division IIIa	3.2%	supêché
Limande (<i>Limanda limanda</i>) Sous-zone IV et Division IIIa	0.0%	en bon état
Limande sole (<i>Microstomus kitt</i>) Sous-zone IV et divisions IIIa, VIId	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Lingue bleue (<i>Molva dypterygia</i>) Divisions IIIa IVa et Sous-zones I II VIII IX XII	0.0%	effondré
Lingue bleue (<i>Molva dypterygia</i>) Sous-division Vb et Sous-zones VI et VII	0.4%	en bon état
Lingue franche (<i>Molva molva</i>) Division Vb	0.0%	surpêché et dégradé
Lingue franche (<i>Molva molva</i>) Divisions IIIa et IVa, Sous-zones VI, VII, VIII, IX, XII et XIV	0.6%	reconstituable/en voie de reconstitution
Maquereau commun (<i>Scomber scombrus</i>) Atlantique Nord-Est	4.6%	en bon état
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>) Division VIa	0.0%	effondré
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>) Division VIb (Rockall)	0.0%	non classifié
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>) Divisions VIb, VIc, VIe à VIk	0.8%	effondré
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>) Sous-zone IV et division VIId	0.8%	supêché
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>) Sous-zone VIII et division IXa	0.4%	reconstituable/en voie de reconstitution
Merlan bleu (<i>Micromesistius poutassou</i>) Sous-zones I-IX, XII et XIV	4.2%	supêché
Merlu européen (<i>Merluccius merluccius</i>) Division 37.GSA7 (Golfe du Lion)	0.3%	effondré
Merlu européen (<i>Merluccius merluccius</i>) Divisions VIIIc and IXa	0.0%	non classifié
Merlu européen (<i>Merluccius merluccius</i>) Sous-zones IV, VI et VII, divisions IIIa IIIa VIIIa VIIIb VIIIc	8.7%	en bon état
Morue de l'Atlantique (<i>Gadus morhua</i>) Division VIa	0.0%	effondré
Morue de l'Atlantique (<i>Gadus morhua</i>) Divisions VIe à VIk	0.1%	effondré
Morue de l'Atlantique (<i>Gadus morhua</i>) Sous-division Vb1	0.0%	surpêché et dégradé
Morue de l'Atlantique (<i>Gadus morhua</i>) Sous-division Vb2	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Morue de l'Atlantique (<i>Gadus morhua</i>) Sous-zone IV et Divisions VIId, IIIan	0.1%	effondré
Morue de l'Atlantique (<i>Gadus morhua</i>) Sous-zones I et II	1.6%	en bon état
Petite roussette (<i>Scyliorhinus canicula</i>) Divisions VIIIa, VIIIb et VIId	0.2%	non classifié
Petite roussette (<i>Scyliorhinus canicula</i>) Divisions VIIIc et IXa	0.0%	non classifié
Petite roussette (<i>Scyliorhinus canicula</i>) Sous-zone IV, divisions IIIa et VIId	0.4%	non classifié
Petite roussette (<i>Scyliorhinus canicula</i>) Sous-zone VI, divisions de VIIa à VIc et VIe à VIj	0.4%	non classifié
Phycis de fond (<i>Phycis blennoides</i>) Atlantique Nord-Est	0.1%	non classifié
Plie cynoglosse (<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>) Sous-zone IV, divisions IIIa et VIId	0.0%	supêché
Plie d'Europe (<i>Pleuronectes platessa</i>) Division VIId	0.4%	supêché
Plie d'Europe (<i>Pleuronectes platessa</i>) Division VIIE	0.0%	supêché
Plie d'Europe (<i>Pleuronectes platessa</i>) Divisions de VIh à VIk	0.0%	effondré
Plie d'Europe (<i>Pleuronectes platessa</i>) Divisions VIb et VIc	0.0%	non classifié
Plie d'Europe (<i>Pleuronectes platessa</i>) Divisions VIIf et VIIG (Mer Celtique)	0.0%	en bon état
Plie d'Europe (<i>Pleuronectes platessa</i>) Sous-zone IV et sous-division IIIa 20	0.0%	en bon état
Plie d'Europe (<i>Pleuronectes platessa</i>) Sous-zone VIII et division IXa	0.0%	non classifié
Pocheteau gris (<i>Raja batis</i>) Sous-zones VI et VII sauf division VIId	0.0%	non classifié
Raie blanche (<i>Rostoraja alba</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	effondré
Raie bouclée (<i>Raja clavata</i>) Division VIIE	0.1%	non classifié
Raie bouclée (<i>Raja clavata</i>) Divisions VIIa, VIIf et VIIG	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Raie bouclée (<i>Raja clavata</i>) Sous-zone IV et Divisions IIIa, VIId	0.3%	non classifié
Raie bouclée (<i>Raja clavata</i>) Sous-zone VI	0.0%	non classifié
Raie bouclée (<i>Raja clavata</i>) Sous-zone VIII	0.1%	non classifié
Raie brunette (<i>Raja undulata</i>) Divisions VIb et VIj	0.0%	effondré
Raie brunette (<i>Raja undulata</i>) Divisions VIId et VIIE	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Raie brunette (<i>Raja undulata</i>) Divisions VIIIa et VIIIb	0.0%	non classifié
Raie chardon (<i>Leucoraja fullonica</i>) Sous-zone IV et division IIIa	0.0%	non classifié
Raie chardon (<i>Leucoraja fullonica</i>) Sous-zone VIII et division IXa	0.0%	non classifié
Raie chardon (<i>Leucoraja fullonica</i>) Sous-zones VI et VII	0.0%	non classifié
Raie circulaire (<i>Leucoraja circularis</i>) Sous-zone VI et VII sauf division VIId	0.0%	non classifié
Raie circulaire (<i>Leucoraja circularis</i>) Sous-zone VIII et division IXa	0.0%	non classifié
Raie douce (<i>Raja montagui</i>) Divisions VIIa, VIIE-h	0.2%	reconstituable/en voie de reconstitution
Raie douce (<i>Raja montagui</i>) Sous-zone IV et divisions IIIa, VIId	0.0%	non classifié
Raie douce (<i>Raja montagui</i>) Sous-zone VI et Divisions VIb-j	0.0%	reconstituable/en voie de reconstitution
Raie douce (<i>Raja montagui</i>) Sous-zone VIII	0.1%	non classifié
Raie fleurie (<i>Leucoraja naevus</i>) Sous-zone IV et Division IIIa	0.0%	non classifié
Raie fleurie (<i>Leucoraja naevus</i>) Sous-zones VI, VII et Divisions VIIIa, VIIIb et VIId	0.6%	reconstituable/en voie de reconstitution
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>) Division VIIE	0.1%	non classifié
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>) Divisions IVc et VIId	0.0%	non classifié
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>) Divisions VIIa, VIIf et VIIG	0.1%	non classifié
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>) Sous-zone VI et Division IVa	0.0%	non classifié
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>) Divisions VIId et VIIE	0.0%	non classifié
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>) Divisions VIIf et VIIG	0.0%	non classifié
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>) Sous-zone VIII et division IXa	0.0%	non classifié
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>) Sous-zones II, IV et Division IIIa	0.0%	effondré
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>) Sous-zones VI et VII sauf division VIId	0.0%	non classifié
Rajidés (<i>Rajidae</i>) Sous-zone IV et divisions IIIa et VIId	0.0%	non classifié
Rajidés (<i>Rajidae</i>) Sous-zone VI et divisions VIIa-c et VIIE-h	0.0%	non classifié
Rajidés (<i>Rajidae</i>) Sous-zone VIII et division IXa	0.0%	non classifié
Renard (<i>Alopias vulpinus</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	effondré
Requin-hâ (<i>Galeorhinus galeus</i>) Atlantique Nord-Est	0.1%	non classifié
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	effondré
Rouget de roche (<i>Mullus surmuletus</i>) Sous-zone IV et divisions VIId, IIIa	0.4%	non classifié
Rouget de roche (<i>Mullus surmuletus</i>) Sous-zones VI, VIII et divisions de VIIa à VIc et de VIe à VIk, IXa	0.3%	non classifié
Rouget de vase (<i>Mullus barbatus</i>) Division 37.GSA7 (Golfe du Lion)	0.1%	supêché
Sabre noir (<i>Aphanopus carbo</i>) Atlantique Nord-Est	0.3%	reconstituable/en voie de reconstitution
Sanglier (<i>Capros aper</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	non classifié

Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>) Division 37.GSA7 (Golf du Lion)	0.1%	reconstituable/en voie de reconstitution
Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>) Division VII sauf 25E4 et 25E5	0.2%	non classifié
Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>) Divisions VIIIa, VIIIb et VIIIc	6.2%	en bon état
Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>) Divisions VIIIc et IXa	0.0%	supêché
Seiche commune (<i>Sepia officinalis</i>) Divisions VIId et VIIf	1.1%	en bon état
Seiche commune (<i>Sepia officinalis</i>) Divisions VIIIa et VIIIb	0.8%	en bon état
Sole commune (<i>Solea solea</i>) Division VIId	0.2%	en bon état
Sole commune (<i>Solea solea</i>) Division VIIf	0.1%	en bon état
Sole commune (<i>Solea solea</i>) Divisions de VIIf à VIIf	0.0%	non classifié
Sole commune (<i>Solea solea</i>) Divisions VIIf et VIIf	0.0%	non classifié
Sole commune (<i>Solea solea</i>) Divisions VIIf et VIIf	0.0%	en bon état
Sole commune (<i>Solea solea</i>) Divisions VIIIa et VIIIb (Golfe de Gascogne)	0.8%	supêché
Sole commune (<i>Solea solea</i>) Divisions VIIIc et IXa	0.0%	non classifié
Sole commune (<i>Solea solea</i>) Sous-zone IV	0.0%	surpêché et dégradé
Sprat (<i>Sprattus sprattus</i>) Divisions VIId et VIIf	0.0%	non classifié
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	effondré
Thon obèse(=Patudo) (<i>Thunnus obesus</i>) Atlantique Nord-Est	0.0%	surpêché et dégradé
Thon rouge de l'Atlantique (<i>Thunnus thynnus</i>) Atlantique Nord-Est	0.1%	reconstituable/en voie de reconstitution
Thon rouge de l'Atlantique (<i>Thunnus thynnus</i>) Méditerranée et Mer Noire	1.3%	reconstituable/en voie de reconstitution
Tourteau (<i>Cancer pagurus</i>) Sous-zone VII et Divisions VIIIa, VIIIb et VIIf	0.9%	surpêché et dégradé
Turbot (<i>Psetta maxima</i>) Sous-zone IV	0.0%	supêché