

# Synthèse des diagnostics établis en 2010

## Etat du stock par rapport aux points de référence

### Tendances de l'évolution des indicateurs

- ↗ tendance générale à la hausse (sur les 10 dernières années)
- ↗- tendance générale à la hausse mais diminution au cours des deux dernières années
- ↗- ? tendance générale à la hausse mais diminution estimée au cours de la dernière année (à confirmer)
- ↘ tendance générale à la baisse (sur les 10 dernières années)
- ↘+ tendance générale à la baisse mais augmentation au cours des deux dernières années
- ↘+ ? tendance générale à la baisse mais augmentation estimée au cours de la dernière année (à confirmer)
- pas de tendance - stabilité

#### Légende :

■	$B_{2010} < B_{lim} (< B_{pa})$ ou $F_{2009} > F_{lim} (> F_{pa})$ ou $F_{2009} > F_{msy}$
■	$B_{lim} < B_{2010} < B_{pa}$ ou $F_{lim} > F_{2009} > F_{pa}$
■	$B_{2010} > B_{pa}$ ou $F_{2009} < F_{pa}$ ou $F_{2009} < F_{msy}$
■	$F_{2009} < F_{pa} < F_{statu\ quo}$ ; <span style="background-color: yellow;">■</span> $F_{pa} > F_{2009} > F_{pn}$
■	$F_{2009} > F_{plan}$ ; <span style="background-color: lightblue;">■</span> $F_{2009} < F_{plan}$
?Ref? : pas de point de référence	
?Ref? : pas de point de référence, mais situation jugée préoccupante	
?B? ou ?F? pas d'estimation en 2010 de B ou F	
?B+Ref? ou ?F+Ref? pas d'estimation en 2010 de B ou F ET pas de point de référence (l'éventuelle coloration reflète une forte présomption)	

#### Mer du Nord – Pêcheurie du plateau (et eaux côtières)

Stock	$B_{2010}/B_{pa}$	Tendance B	$F_{2009}/F_{pa}$	Tendance F	$F_{2009}/F_{msy}$	$F_{2009}/F_{plan}$
Eglefin	1.38	↘	0.33	↘	0.8	0.8
Sole	0.94	→	0.90	↘	1.6	1.8
Plie	1.89	↗	0.45	↘	1.2	0.9

#### Mer du Nord – Pêcheurie de petits pélagiques

Stock	$B_{2010}/B_{pa}$	Tendance B	$F_{2009}/F_{pa}$	Tendance F	$F_{2009}/F_{msy}$	$F_{2009}/F_{plan}$
Hareng	1.01	↘	0.45	↘	0.45	0.5 juvéniles 0.8 adultes

#### Mer du Nord + Ouest Ecosse – Pêcheurie du plateau

Stock	$B_{2010}/B_{pa}$	Tendance B	$F_{2009}/F_{pa}$	Tendance F	$F_{2009}/F_{msy}$	$F_{2009}/F_{plan}$
Lieu noir	1.16	→	0.74	→	1.0	1.0

#### Mer du Nord + Manche Est – Pêcheurie du plateau (et eaux côtières)

Stock	$B_{2010}/B_{pa}$	Tendance B	$F_{2009}/F_{pa}$	Tendance F	$F_{2009}/F_{msy}$	$F_{2009}/F_{plan}$
Morue	0.37	↗-	1.31	↗	4.5	2.1
Merlan	?Ref?	↗	?Ref?	→	?	sans objet
Rouget barbet	?B?Ref?	↗	?F?Ref?	?	?	sans objet

### Manche Est – Pêcheurie côtière (et du plateau)

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Sole	1.38	↗-	1.27	↗	1.7	sans objet
Plie	?B ?	→+	?F ?	↘	?	sans objet

### Manche Est – Pêcheurie côtière

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Coquille StJacques	?Ref ?	↗	?F?Ref?	→	?	sans objet

### Manche Ouest – Pêcheurie côtière (et du plateau)

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Sole	0.86	↘	?Ref?	↗-	0.9	0.9
Plie	0.87	↘+	0.97	↗-	2.3	sans objet
Bar	?B?Ref?	↘	?F?Ref?	↗		sans objet

### Manche Ouest – Pêcheurie côtière

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Bulot	?B?Ref ?	↘+?	?F?Ref?	↘ ?	?	sans objet
Coquille StJacques (Saint Brieuc)	?Ref ?	→-	?Ref?	→-	?	sans objet

### Ouest Ecosse – Pêcheurie du plateau

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Morue	0.28	↗	?F ?	→	?	?
Merlan	?B?	↘	?F ?	↘	?	sans objet
Eglefin	0.45	↘	0.61	↘	1.0	sans objet

### Ouest Ecosse – Pêcheurie de la pente continentale

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Grenadier	?B ?Ref ?	→	?F ?Ref ?	↘ ?	?	sans objet
Sabre	?B ?Ref ?	→	?F ?Ref ?	↘ ?	?	sans objet
Lingue bleue	?B ?Ref ?	→+	?F ?Ref ?	↘ ?	?	sans objet

### Mer Celtique – Pêcheurie du plateau

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Morue	?B?	?	?F?	?	?	sans objet
Merlan	?B?	↗	?F?Ref?	↘	?	sans objet
Eglefin	?B?Ref?	↗	?F?Ref?	↗	?	sans objet
Langoustine(VIIgh)	?B?Ref?	?→?	?F?Ref?		?	sans objet
Sole (VIIfg)	2.01	↗	0.52	↘	0.6	sans objet
Plie (VIIfg)	0.63	↗	?Ref?	↘	2.2	sans objet

### Mer Celtique + Golfe de Gascogne – Pêcheurie du plateau (et eaux côtières)

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Baudroie blanche	?B?	?↗-	?F?	?	?	sans objet
Baudroie noire	?B?	?↗-	?F?	?	?	sans objet
Cardine	?B?	?→?	?F?	?	?	sans objet
Merlu	?B?Ref?	↗	?F?Ref?	↘	?	?
Tourteau	?B ?Ref ?	? → ?	?F ?Ref ?	→ ?	?	?

### Golfe de Gascogne – Pêcheurie du plateau (et eaux côtières)

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Langoustine	?Ref?	→+	?Ref?	→-	?	sans objet
Sole	1.09	↗	0.78	↘	1.3	sans objet
Bar	?B?Ref?	?	?F?Ref?	↗	?	sans objet
Rouget barbet	?B?Ref?	→	?F?Ref?	?	?	sans objet

### Golfe de Gascogne – Pêcheurie des eaux côtières

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Coquille StJacques Pertuis Charentais	?	→	?	→	?	sans objet
Palourde Golfe du Morbihan	?B?Ref?	→	?F?Ref?	?	?	sans objet
Palourde Bassin d'Arcachon	?Ref?	↘+ ?	?F?Ref?	?	?	sans objet

### Golfe de Gascogne – Pêcheurie de petits pélagiques

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Anchois	1.56	↗	?Ref?	↗	?	sans objet
Sardine	?B?Ref?	→	?F?Ref?	↗ ?	?	sans objet

### Atlantique – Pêcheurie de petits pélagiques

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Maquereau	1.27	↗	~1.0	→	1.1	1.1
Chinchard	?Ref?	→	?Ref?	↗	0.7	sans objet
Merlan bleu	0.58	↘	1.25	→-	2.2	8.0

### Atlantique Nord - Pêcheurie de grands pélagiques

Stock	Tendance B	Tendance F	F/F <sub>PME</sub>	B/B <sub>PME</sub>
Germon	→-	→-	1.05 [0.8-1.2]	0.62 [0.4-0.8]
Marlin bleu			> 1 ?	< 1
Espadon	↗	↘	0.76 [0.7-1.0]	1.05 [0.9-1.2]

### Golfe du Lion – Pêcheurie du plateau continental (et eaux côtières)

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmax	F <sub>2009</sub> /Fplan
Merlu	?Ref?	↗	3.03	↗	4.4	sans objet
Rouget de vase	?Ref?	?	1.43	?	1.7	sans objet

### Golfe du Lion – Pêcheurie de petits pélagiques

Stock	B <sub>2010</sub> /Bpa	Tendance B	F <sub>2009</sub> /Fpa	Tendance F	F <sub>2009</sub> /Fmsy	F <sub>2009</sub> /Fplan
Anchois	?Ref?	Totale : → Géniteurs : ↘	?F?Ref ?	↘	?	sans objet
Sardine	?Ref?	Totale : ↘ Géniteurs : ↘	?Ref?	↘	?	sans objet

### Méditerranée + Atlantique Est - Pêcheurie de grands pélagiques

Stock	Tendance B	Tendance F	F/F <sub>0.1</sub>	B/B <sub>0.1</sub>
Thon rouge	→	↘ (adultes) incertaine (juvéniles)	2.9	0.35 [0.19-0.51]

**Méditerranée - Pêche de grands pélagiques**

Stock	Tendance B	Tendance F	F <sub>2005</sub> /F <sub>PME</sub>	B <sub>2005</sub> /B <sub>PME</sub>
Espadon	↘	↗?	1.3 [0.6-2.5]	[0.3-0.9]

**Méditerranée + Atlantique – Pêche littorale**

Stock	B <sub>2010</sub> /B <sub>pa</sub>	Tendance B	F <sub>2009</sub> /F <sub>pa</sub>	Tendance F	F <sub>2009</sub> /F <sub>msy</sub>	F <sub>2009</sub> /F <sub>plan</sub>
Anguille	?B ?Ref?	↘?	?F ?Ref?	↘?	?	sans objet

**Océan indien - Pêche de grands pélagiques**

Stock	Tendance B	Tendance F	F <sub>2008</sub> /F <sub>PME</sub>	B <sub>2008</sub> /B <sub>PME</sub>
Espadon	↘	↘	[0.53 - 0.94]	[0.93 - 1.36]

**Atlantique nord-ouest – Pêche du plateau**

Stock	B <sub>2010</sub> /B <sub>pa</sub>	Tendance B	F <sub>2009</sub> /F <sub>pa</sub>	Tendance F	F <sub>2009</sub> /F <sub>msy</sub>	F <sub>2009</sub> /F <sub>plan</sub>
Morue 3Ps	1.07	↘+				

**Atlantique Guyane – Pêche du plateau**

Stock	B <sub>2010</sub> /B <sub>pa</sub>	Tendance B	F <sub>2009</sub> /F <sub>pa</sub>	Tendance F	F <sub>2009</sub> /F <sub>msy</sub>	F <sub>2009</sub> /F <sub>plan</sub>
Crevette	?Ref?	↘	?Ref?	↘	?Ref?	sans objet
Vivaneau	?Ref?	↗	?Ref?	→	?Ref?	sans objet